

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D R A F
C.C.P. Montpellier 5238-57

Grandes cultures

5 - 3 juillet 1987

LUZERNE A GRAINES

(en collaboration avec la FNAMS et les
SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

TORDEUSES : CAPTURES IMPORTANTES


→ TRAITER EN TOUTES ZONES À L'EXCLUSION DE L'OUEST
AUDOIS

TYCHIUS-PUNAISES : A SURVEILLER

Le seuil de nuisibilité de 30-35 captures est souvent atteint et quelquefois largement dépassé dans la majorité des zones - sauf l'ouest audois - où le STADE SENSIBLE GOUSSE VERTE est généralisé (parcelles non précoupées ou précoupées précocement).

1) contre Tordeuses et Tychius : - zones précoces cotières dès réception
TRAITEZ à l'aide d'une spécialité (Azophène - Zolone) contenant de la phosalone à raison de 1000 g de m.a./ha de préférence en soirée en l'absence de pollinisateurs.

3-5 stries noires 15 à 20 mm
au bord costal d'envergure alaire



Adulte de tordeuse
couleur gris-brunâtre

2) contre les punaises : **Préférez** une spécialité contenant de l'endosulfan à raison de 1000 g de m.a./ha.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX Tél. 67 92.41 42



MAIS

(en collaboration avec les SUAD
de l'Hérault et du Gard)

PYRALE : - LE VOL SE MAINTIENT A UN NIVEAU ÉLEVÉ
- PREMIÈRES PÉNÉTRATIONS OBSERVÉES
ACARIEN : À SURVEILLER ET INTERVENIR SI NÉCESSAIRE
PUCERONS : PEU PRÉSENTS

PYRALE :

- L'essentiel du vol est toujours en cours. Il risque d'être plus étalé qu'à l'habitude et se prolonger jusqu'au 5-10 juillet.
- Les premières pénétrations ont été observée à la fin juin.
- Selon les situations, et tout particulièrement dans les parcelles déjà attaquées et précoces (stade 8-10 F atteint).

→ Réalisez un traitement dans la période du 5 au 10 juillet

→ En zones plus tardives repousser l'intervention dans la période du 10 au 15 juillet.

N.B. : 1) Concernant la décision d'intervention au niveau du risque se reporter au bulletin précédent.

2) Préférez les produits de type micro-granulé.

3) Les spécialités phytosanitaires doivent être employées seules et non en mélange.

ACARIENS :

Pour une intervention éventuelle, se reporter à la note commune AGPM - INRA - 'SPV publiée dans le bulletin N° 3 du 4 juin 1987.

PUCERONS :

Inutile d'intervenir pour le moment.